



Betegtájékoztató és beleegyező lap **Laparoszkópos beavatkozások**

Tisztelt Hölgyem/Asszonyom!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében laparoszkópos beavatkozás válik szükségessé. A ceglédi Toldy Ferenc Kórház Szülészeti-nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy mindent mérlegelve döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

A laparoszkópia a legkorszerűbb vizsgáló és gyógyító eljárások egyike, melynek révén számos betegségben jelentősen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a betegség pontos megállapítása és az esetek nagy részében - a hagyományos műtét elvégzése nélkül - a gyógyítása is. Mindezek következtében a beteg műtét utáni fájdalmai minimálisak, és a munkaképesség diagnosztikus beavatkozás után pár nap, operatív beavatkozás után pedig egy-két hét után áll helyre.

A beavatkozás célja:

Laparoszkópiát lehetséges és javasolt elvégezni méhen kívüli terhesség, meddőség, petefészek ciszta, a méh rendellenes helyzete, endometriózis, ismeretlen eredetű alhasi fájdalom, belső nemi szervek fejlődési rendellenessége, bizonyos hormonzavarok, méhtest eltávolítás, myoma (jóindulatú méhizomdaganat) göb eltávolítás, petevezető és petefészek eltávolítás, továbbá művi meddővé tétel esetén. Gyakran végzünk laparoszkópiát sterilitás kivizsgálásának részeként. Cél az anatómiai szituáció tisztázása, a petevezetők átjárhatóságának ellenőrzése szükség és lehetőség szerint helyreállítása.

Hogyan történik a beavatkozás?

Megfelelő kivizsgálását követően a műtetre előkészítjük (diéta, beöntés, borotválás, gyógyszerelés, infúzió bekötés, hólyagkatéter felhelyezés), melyeknek a műtéti szövődmények megelőzésében van elengedhetetlen szerepük. A műtét napjára a körömlakkot, műkörmöt, ékszer, kivehető fogat el kell távolítani.

Kórházi öltözetben fogják a műtőbe vinni, ahol a beavatkozást az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítési módban végezzük (erről külön nyomtatványon kap tájékoztatást és kérjük, ehhez adja beleegyezését). Általában mély altatásban és lazításban, a köldökénél kb. 1 cm hosszúságú metszést ejtünk, amelyen keresztül a hasüreget széndioxid gázzal feltöltjük. Ez a hasfalat megemeli, majd bevezetjük a hasüregen belüli látást és tájékozódást biztosító optikai eszközt, a laparoszkópot. Ezáltal lehetővé válik a méh, petevezetők, petefészkek és a kismedence megfigyelése és szükség esetén operációja. A műtéti beavatkozáshoz még további

eszközök (fogó, olló, elektromos kés, stb.) bevezetése is szükséges, amely az alhasban rendszerint kétoldalt történik fél-fél cm-es metszésből.

A hasban találkozhatunk olyan szituációval, elváltozással, esetleg történhet olyan szövődmény mely miatt a has megnyitására kényszerülünk a további ellátás céljából. Előfordulhat olyan anatómiai szituáció, mely során a hüvely felől a méhbe eszközt kell felvezetni, mellyel a műtét során a méhet alulról mozgatni tudjuk. Amennyiben sterilitás miatt történik a beavatkozás, a kürtök átjárhatóságának vizsgálata igényel egy speciális fecskendőszerű eszközt, melyet a méhszájhoz rögzítünk. A hasüregben a kürtök szájadékánál látható, hogy a hüvely felől a méhszájba fecskendezett kék színű folyadék megjelenik-e a hasüregben a méhüregen és a petevezetőkön átjutva. Amennyiben a kürtök lezártak, próbáljuk a végét megnyitni. Sikertelenség esetén a kürtök eltávolítása is szóba jön (a mesterséges megtermékenyítést nehezíti a nem működő, lezárt petevezető jelenléte). A műtét során eltávolított szerveket, szövetrészeket, szövetet minden esetben szövettani vizsgálatra küldjük. A behatolási nyílásokat öltésekkel zárjuk.

Melvek a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát! Szövődmények adódhatnak behatolásakor a környező belek, erek, idegek sérüléséből, valamint széndioxid feltöltéskor annak vérbe jutásakor embóliát okozva. Tekintve, hogy a műtét területe a kismencede, ahol idegek, belek, nagy erek, húgyvezetők, húgyhólyag, méh és petefészkek egymással szoros közelségben és összeköttetésben vannak, ezért műtét kapcsán ezek bármelyike sérülhet. Az esetleges sérülés ellátásához a has megnyitására is kényszerülhetünk. Műtét közben és/vagy utána előforduló erős vérzések esetén esetlegesen vérkészítmények beadására is kényszerülhetünk. Ezen készítmények szigorú szűréseken, teszteken esnek át beadásuk előtt /kérjük, a vérkészítmények beadásáról szóló tájékoztatónkat kérje és olvassa el!/. A műtét után jelentkező utóvérzések ismételt műtét végzésének szükségességét is felvethetik. Tekintettel a kis hasfali sebzésekre lázas állapot nagyon ritkán fordul elő, sebgyógyulási zavar, vérömleny, váladékozás alig alakul ki. A méhbe vezetett szonda méhfal sérülést okozhat, ennek valószínűsége csekély. Ezeknek az esetleges és ritka szövődményeknek az elhárítására, ellátására, gyógyítására megfelelő felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezünk. Osztályunkon ehhez a feltételek biztosítottak. Amennyiben a szövődmények lehetőségéről további kérdése van, kérjük szóban tegye meg kezelőorvosa felé.

Műtét utáni időszak eseményei

Műtét után az un. „műtétes kórterembe” kerül, ahol műszerekkel, vér- és vizeletvizsgálatokkal követjük állapotát. Ilyenkor előfordulhat vérnyomás-ingadozás, hányás, folyadékvesztesség. Állandó vénatűjén keresztül pótoljuk a folyadékvesztességet, adjuk a gyógyszereket. A széndioxid feltöltésből kevés gáz maradhat vissza a belek között, mely eleinte felkeléskor rekeszalatti nyomásérzékenységet, csuklást rossz érzetet okozhat. Minimális sebfájdalma gyorsan szűnik. Az öltések eltávolítása 3-4 nappal a műtét után történik. A méhbe vezetett szonda kevés hüvelyi vérzést eredményezhet. Amennyiben sterilitás kivizsgálásának részeként a kürtöket kék festékes folyadékkal átfújtuk, vizelete rövid ideig enyhén kék színű lehet, jelentősége nincs. A ciklusa nem fog változni, sőt betegsége megszűntével, amennyiben az rendellenes volt, normalizálódhat. Szexuális életét a műtét nem befolyásolja. Teherbeesési és kihordási esélyeiről műtét után tájékoztatjuk. Sterilizáció (művi meddővé tétel) céljából végzett

műtétet követően igen ritkán, a petevezető újra megnyílhat, méhúri vagy méhen kívüli terhesség jöhet létre. Ezért gyanús tünetek, vérzéskimaradás, elhúzódó vérzés, terhességi jelek esetén azonnal keresse fel kezelőorvosát

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtétet követően pár napig kímélő életmód javasolt. Szövetteni eredményéért 4 héten belül mindenféleképpen jelentkeznie kell saját érdekében. Ennek elmaradásából eredő esetleges következményekért a kórház nem vállal felelősséget. A kórház rossz eredmény esetén sem küld értesítést. Az eredmény alapján kezelőorvosa javaslatot tesz a további terápiára.

Műtét elmaradásának következményei:

Tisztelt Betegünk! Tudjuk, hogy bizonyos szövődmények lehetősége visszatartó erejű, de döntését a műtėti beleegyezésbe az vezérelje, hogy gyógyulása, életkilátásainak, életminőségének javítása érdekében történik minden és sokkal nagyobb a haszon reménye, mint a kockázat veszélye.

Amennyiben a felajánlott műtétet nem végezhetjük el, az észlelt elváltozások tovább fejlődhetnek, terjedhetnek. Ezek

fájdalomérzet fokozódásával, teherbeesési esélyek csökkenésével, vagy terhesség kiviselésének zavaraival járhatnak. Amennyiben teherbeesési problémái vannak, az esetleges későbbi mesterséges megtermékenyítési programba a műtét nélkül nem is léphet be.

Ha meddővé tétel céljából jelentkezett, akkor tudnia kell, hogy a lekötés nem visszafordítható beavatkozás, hatása végleges.

Az általunk javasolt és tervezett műtėti beavatkozás a következő:.....

.....

A műtėti terv az operáció közben előre nem látható okok miatt változhat.

Amennyiben ismeretlen eredetű alhasi fájdalom miatt történik a műtét, úgy nem csak a diagnózis felállítása a cél, hanem a probléma, szükség szerinti műtėti megoldása is. Erről kezelőorvosa az adott lehetőségeknek megfelelően tájékoztatja Önt.

Beleegyezési nyilatkozat

A „laparoszkópos” műtéti beavatkozásról a vérkészítmények adásáról szóló tájékoztatót elolvastam, az orvos által hozzáfűzött szóbeli és írásbeli tájékoztatás szerint a rajzos kiegészítést megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozásról minden számomra fontos információnak birtokában vagyok és ezek ismeretében a beavatkozás elvégzésébe, beleegyezek, és kifejezetten kérem azt.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének elutasítására. Ez esetben a kezelés során, az elutasítás következtében bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, nem teszem felelőssé, őket a felelősség alól kifejezetten és visszavonhatatlanul felmentem.

A kezelésbe (műtétbe) való beleegyezésemet a tájékoztatás megértése alapján, minden kényszerszertől mentesen adom

Megjegyzéseim:.....

.....

/ide azt írja, kérem, amit elutasít, illetve ha esetleg feltételelesen járul csak hozzá, beavatkozásunkhoz/

Hozzáartozóim tájékoztatásáról a következőket rendelem:

Az alább megnevezett hozzáartozóimat a betegségemről teljes körűen tájékoztassák:.....

.....

Az alább megnevezett hozzáartozóimat a betegségemről az általam megjelölt következő korlátozásokkal

tájékoztassák:.....

.....

Az alább megnevezett hozzáartozóimat betegségemről kérésükre se tájékoztassák:.....

.....

Kijelentem, hogy tájékoztatásom megfelelő volt, további kérdésem nincs.

.....
kezelőorvos aláírása

.....
beteg vagy törvényes képviselő aláírása

Cegléd, 20.....

Tájékoztatásról való lemondás nyilatkozata

„Aláírással megerősítve kinyilvánítom, hogy betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, különösen pedig gyógyulási kilátásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást kapni. Ezért a döntéseket kezelőorvosomra bízom és minden általa szükségesnek vélt gyógyítási, műtéti metodikába fenntartás nélkül beegyezek.”

Ezt a nyilatkozatot -elfogadása esetén- kézírásával megismételten leírva, majd az okirat végén aláírva erősítse meg. E megerősítő nyilatkozat hiányában a tájékoztatásról való lemondása érvénytelen.

Cegléd, 200.....

.....
Beteg vagy törvényes képviselő aláírása